

發行人:陳冠宇

指導:黃聖芳

期別: 110-1-08期

主編: 春暉社長蘇柏聿

副編: 春暉文書廖睿蓁

出刊日期: 110.11.04

春暉周刊

中樞神經興奮劑&中樞神經迷幻劑

- 中樞神經興奮劑: 刺激中樞神經系統的精神藥物，其中包括令人感到愉快、振奮的，可以提升警覺心、注意力和活力，可作為處方箋，但現恐大多非法使用，做為娛樂性藥物。
- 中樞神經迷幻劑: 精神活性劑，通常或通常會導致幻覺、感知異常。

中樞神經興奮劑

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
古柯鹼 Cocaine 可卡因 快克 crack snow	I	局部麻醉 止流鼻血	鼻吸 煙吸 注射	興奮、瞳孔放大、失眠、躁動、焦慮不安、食慾不振、噁心、嘔吐、妄想型精神病、心律不整、痙攣。 戒斷症狀 呆滯、疲勞、焦慮、煩躁不安、憂鬱。
安非他命 Amphetamine 甲基安非他命 Methamphetamine 冰塊 冰糖 鹽 安公子 安仔 炮仔	II	無	口服 鼻吸 煙吸 注射	1.精神方面不良作用： 失眠、焦慮、暴躁易怒、情緒不穩、記憶減退、妄想、視幻覺、聽幻覺、譫妄、具攻擊性、自殺及殺人傾向、精神分裂症(思覺失調症)、神經系統傷害等。 2.心臟血管不良作用： 心跳加速、心悸、心律不整、高血壓、腦溢血。 3.過量時：會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至會導致死亡。 戒斷症狀 沮喪、憂鬱、全身乏力、焦慮易怒。
亞甲基雙氧 甲基安非他命 Methylenedioxy-methamphetamine 搖頭丸 狂喜 忘我 綠蝴蝶 MDMA	II	無	口服	3.過量時：會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至會導致死亡。 戒斷症狀 沮喪、憂鬱、全身乏力、焦慮易怒。

中樞神經迷幻劑

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
大麻 Cannabis Marijuana Hemp 草 麻仔 老鼠尾	II	無	口服 煙吸	1.吸食後會產生心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、呼吸道疾病、動機缺乏症候群。 2.青少年使用會造成智力商數下降，記憶及學習能力降低。 3.孕婦使用會造成胎兒腦部發育異常。 戒斷症狀 易怒不安、躁動、食慾減退、失眠。
麥角二乙胺 Lysergic acid diethylamide (LSD) 搖頭丸 ELISA 加州陽光 白色閃光 Acid	II	無	口服 舌下	瞳孔放大、體溫升高、心跳及血壓上升、思考及感覺扭曲、妄想、肌肉僵直及發抖，過量可造成精神疾病甚至死亡。
苯環利定 Phencyclidine (PCP) 天使塵	II	無	口服 煙吸 鼻吸 注射	幻覺、妄想、感覺扭曲、步態不穩、眼球震顫、失憶、言語及思考障礙、憂鬱、暴力及自殘行為，昏迷甚至死亡。
西洛西賓 Psilocybine 迷幻蘑菇	II	無	口服	幻覺、無法區分現實和幻覺、恐慌、肌肉無力、瞳孔放大、噁心、嘔吐、嗜睡。